Matydol Gesic

ANALGESICO
ANTIINFLAMATORIO

Paracetamol / Diclofenac Potásico / Papaína / Hidróxido de Aluminio

VENTA BAJO RECETA **COMPRIMIDOS RECUBIERTOS** **VIA ORAL**

Composición:

Cada comprimido recubierto contiene:

DICLOFENAC POTÁSICO	**50mg.**
PARACETAMOL	**400mg.**
PAPAÍNA	**1000U.I.**
HIDRÓXIDO DE ALUMINIO	**100 mg.**
Excipientes	**c.s.p.**

Mecanismo de acción:
La combinación de la acción analgésica y antipirética del paracetamol con el efecto antiinflamatorio del diclofenac potásico, inhiben la síntesis de prostaglandinas haciendo desaparecer la inflamación y el dolor. La actividad enzimática proteolítica de la papaína colabora en la mejora del proceso inflamatorio; para protección de la mucosa gástrica se asocia el hidróxido de aluminio, de acción antiácida que alivia el dolor provocado por las úlceras de pirosis, con la papaína regulariza el ph gástrico.

Indicaciones terapéuticas:
En el tratamiento de la inflamación, fiebre, dolor postraumático y postoperatorio: tales como artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, dismenorrea primaria, artrosis, mialgias, ruptura muscular. Para el tratamiento de dolor de cabeza, dientes, dolores menstruales, lumbago.

Posología Modo de Uso:
Salvo mejor criterio médico administrar 1 comprimido cada 8 horas, por vía oral preferentemente con los alimentos para evitar la irritación gástrica.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad conocida al Paracetamol, Diclofenac, papaína, hidróxido de aluminio o a cualquiera de los componentes de la fórmula. Antecedentes de úlcera gastroduodenal, insuficiencia hepática y lesiones renales. Al igual que otros agentes antiinflamatorios no esteroides, está contraindicado en pacientes a quienes el ácido acetilsalicílico y otros agentes inhibidores de la prostaglandina sintetasa desencadene ataques de asma, urticaria o rinitis aguda. El producto no puede ser administrado en caso de enfermedad hepática, hepatitis virales, trastornos renales o alcoholismo.

Reacciones Adversas; Efectos Colaterales:
En ocasiones pueden presentarse algunos efectos adversos como náuseas, diarrea, mareos, cefaleas, reacciones de hipersensibilidad incluyendo urticaria y rash cutáneo. Más raramente se pueden presentar trombocitopenias, leucopenias, anemia hemolítica, anemia aplásica, broncospasmos, hepatitis con ictericia o sin ella, reacciones sistémicas anafiláctica e incluso hipotensión. Su uso por periodos prolongados puede producir daño hepático o renal, alteraciones sanguíneas.

Precauciones y Advertencias:
Este producto debe ser administrado con precaución a pacientes con antecedentes de enfermedades del tracto digestivo superior, por la posibilidad de gastritis, úlcera péptica, o sangrado gastrointestinal.
El paracetamol puede producir daño hepático cuando se ingiere en dosis excesivas.
No se recomienda su uso junto con anticoagulantes ni durante el embarazo y la lactancia. En pacientes sometidos a tratamiento prolongado se deberán realizar recuentos hemáticos periódicos y controlar la función hepática y renal. Se debe utilizar con cuidado en casos de pacientes alcohólicos y en pacientes ancianos debilitados, en quienes se recomienda ajustar la dosis.

Restricciones de Uso:
En caso de embarazo y/o lactancia, consulte a su médico.

Interacciones:
El Paracetamol puede modificar los efectos anticoagulantes orales o de otros antinflamatorios. Se puede producir hipotermia severa en pacientes bajo tratamiento con fenotiazinas u otros antipiréticos. La administración con otros antiinflamatorios no esteroides puede potenciar los efectos terapéuticos, pero también los tóxicos. Con preparados de litio o digoxina, se puede elevar el nivel plasmático de éstos. Este producto puede inhibir el efecto de los diuréticos y aumentar la concentración sanguínea del metotrexate y de la ciclosporina elevando su toxicidad.

Sobredosis:
Los casos de sobredosis se presentan en forma aislada. Los síntomas pueden incluir disturbios del sistema nervioso central con vértigos, cefalea, hiperventilación, confusión y, en niños, calambres mioclónicos. A nivel gastrointestinal náuseas, y vómitos, dolor abdominal y sangrado. En estos casos se debe iniciar el tratamiento con N-acetilcisteína por vía intravenosa sin esperar a que aparezcan los síntomas, pues la necrosis es irreversible además de lavado gástrico con carbón activado, lo más rápido posible para evitar mayor absorción, y luego tratamiento sintomático y de sostén. Concurrir al hospital más cercano o comunicarse a Emergencias Médicas - Departamento de Toxicología. Teodoro S. Mongelós esq. Gral. Santos - Teléfono: 220418

Presentación:
Caja conteniendo 20 comprimidos recubiertos

Conservación:
Conservar a temperatura ambiente (15 a 30°c) y protegido de la luz.
Mantener fuera del alcance de los niños.

indexpharma

Para: **Index S.A.C.I.**
Boquerón 676 c/ Misiones - Asunción, Paraguay
Teléfono: 021 203 860 Fax: 021 213 973
Pág. Web: www.index.com.py
D.T.Q.F. Dr. Ernesto Wasmosy M.
Reg. Prof. Nº 717
Autorizado en Paraguay por el M.S.P. y B.S.
Reg. N°: 19376 - 01 - EF

Elaborado por: Gramon Paraguay S.A.C.I.F.I.A.
Avda. Defensores del Chaco Nro. 2567
Villa Elisa - Paraguay
Reg. Q.F. Edda Caballero
Reg. Prof. Nº 2349